

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗУ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Клименко В. О., Шкандала А. Ю., Болецька Т. О

Сумський державний університет, кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією

Актуальність. Лайм-бореліоз (ЛБ) є найпоширенішою трансмісивною інфекцією, що передається кліщами, у країнах північної півкулі, а за темпами поширення займає друге місце після ВІЛ-інфекції в країнах Центрально-Східної Європи. Цьому сприяє великий поліморфізм клінічних симптомів і це призводить до того, що хворі, як правило, звертаються за допомогою до різних спеціалістів – дерматолога, кардіолога, ревматолога, невропатолога і вкрай рідко – до інфекціоніста. Тому не випадково це захворювання називають «великий імітатор». Відсутність знань у багатьох лікарів про особливості перебігу хвороби не дозволяє своєчасно розпізнати та лікувати її, запобігти можливості переходу однієї стадії в іншу.

Мета роботи. Дослідити епідеміологічні особливості ЛБ у Сумській області.

Матеріали та методи. Щорічні звіти обласної санітарно-епідеміологічної станції в Сумській області з ЛБ.

Результати. Сумщина залишається високоактивним осередком ЛБ в Україні. За рівнем захворюваності у 2012 році Сумська область займала 4 місце по Україні (5,12 на 100 тис. населення), поступаючи Донецькій (5,61), Тернопільській (5,46) та Київській (5,26) областям, при середньоукраїнському рівні захворюваності 3,7. У 2013 році на Сумщині показник захворюваності сягнув 6,0, а середньоукраїнський – 4,25.

З 2004 по 2013 роки спостерігається позитивний абсолютний приріст захворюваності, за винятком 2007 та 2009 років.

Середній показник захворюваності в області на ЛБ з 2004 по 2013 рр. становить 3,4 на 100 тис. населення. Враховуючи середній розрахунковий рівень захворюваності на ЛБ, з 2004 по 2013 рр. встановлена виражена тенденція до зростання захворюваності (Т ср.пр. + 31,2).

Згідно з проведеними дослідженнями середня захворюваність у районах вище (4,3) ніж у містах (3,3).

До районів з найвищими показниками захворюваності відносяться Краснопільський, Шосткінський

Висновки. Захворюваність на ЛБ у Сумській області має виражену тенденцію до зростання. Відмічений ріст захворюваності серед населення районів області.